




Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Una opción de tratamiento innovadora

JELMYTO es su socio en el
tratamiento del carcinoma
urotelial del tracto superior
de bajo grado

Uso aprobado de JELMYTO

JELMYTO[®] es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos con un tipo de cáncer que afecta el revestimiento de las vías urinarias superiores, incluido el riñón, llamado carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado (low-grade Upper Tract Urothelial Cancer, LG-UTUC).


Información importante de seguridad

No debe recibir JELMYTO si tiene un agujero o un desgarro (perforación) en la vejiga o el tracto urinario superior.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.

No es un paciente real.

En qué consiste el carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado



El LG-UTUC es un cáncer poco frecuente que afecta el revestimiento de los riñones (1) y los uréteres (2).

Este revestimiento se denomina “urotelio”.

Información importante de seguridad

No debe recibir JELMYTO si tiene un agujero o un desgarro (perforación) en la vejiga o el tracto urinario superior.

Antes de recibir JELMYTO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si:

- está embarazada o planea quedar embarazada. JELMYTO puede dañar al bebé en gestación. No debe quedar embarazada durante el tratamiento con JELMYTO. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con JELMYTO.

Mujeres que pueden quedar embarazadas: debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con JELMYTO y durante los 6 meses posteriores a la última dosis.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

JELMYTO es una opción de tratamiento que puede ser adecuada para usted



La cirugía menor puede no ser suficiente

El tratamiento endoscópico, también llamado “resección endoscópica”, es una intervención quirúrgica menor que se realiza para extirpar tumores.



La cirugía mayor puede ser demasiado

La nefroureterectomía radical (radical nephroureterectomy, RNU) es una intervención quirúrgica en la que se extirpan el riñón, el uréter y una pequeña parte de la vejiga.

JELMYTO es un tipo diferente de quimioterapia cuya eficacia en el tratamiento del LG-UTUC está demostrada*

*Resultados obtenidos cuando se administró JELMYTO en el estudio Olympus de UroGen.

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de recibir JELMYTO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si (cont.)

- Hombres en tratamiento con JELMYTO:** si tiene una pareja de sexo femenino que puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con JELMYTO y durante los 3 meses posteriores a la última dosis.
- está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si JELMYTO pasa a la leche materna. No dé el pecho durante el tratamiento con JELMYTO ni durante la semana posterior a la última dosis.
- **Informe a su proveedor de atención médica si toma diuréticos.**

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.

Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Cómo actúa JELMYTO para ayudar a combatir el cáncer



JELMYTO es una quimioterapia innovadora que se administra directamente en la zona afectada del riñón y permanece allí entre 4 y 6 horas. No recorre todo el cuerpo como la quimioterapia tradicional.



JELMYTO se administra por medio de un proceso llamado “instilación”. Se introduce en los lugares de difícil acceso del tracto urinario superior.



JELMYTO permanece en el riñón entre 4 y 6 horas, lo que ayuda a que los tumores desaparezcan.* Después del tratamiento, JELMYTO se disuelve poco a poco y se elimina del organismo a través de la orina.

*Resultados obtenidos cuando se administró JELMYTO en un ensayo clínico llamado Olympus.

Información importante de seguridad (cont.)

¿Cómo recibiré JELMYTO?

- Su proveedor de atención médica le indicará que tome un medicamento llamado bicarbonato de sodio antes de cada tratamiento con JELMYTO.
- Su proveedor de atención médica le administrará la dosis de JELMYTO una vez por semana durante 6 semanas. Es importante que reciba las 6 dosis de JELMYTO de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica. Si falta a una cita, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla. Es posible que su proveedor le recomiende hasta 11 dosis mensuales adicionales.
- JELMYTO se administra en el riñón a través de un tubo llamado “catéter”.
- Durante el tratamiento con JELMYTO, es posible que su proveedor le indique que tome otros medicamentos o que modifique la forma en que toma sus medicamentos actuales.

Después de recibir JELMYTO:

- JELMYTO puede darle a la orina un color entre violeta y azul. Evite el contacto de la piel con la orina durante al menos 6 horas.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Se ha demostrado que ayuda a eliminar tumores en el carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado

JELMYTO se probó en un estudio clínico llamado Olympus.

Algunos participantes del estudio acababan de recibir el diagnóstico y más de la mitad había recibido un tratamiento anterior para el LG-UTUC. Algunos de ellos presentaban tumores de difícil acceso que no podían extirparse únicamente mediante tratamiento endoscópico.

Los resultados del estudio Olympus mostraron lo siguiente:

58 % de los participantes ya no presentaban tumores después del tratamiento con JELMYTO.*

*Resultados obtenidos cuando se administró JELMYTO en un ensayo clínico llamado Olympus.



Al cabo de 1 año, el 56 % de los pacientes cuyos tumores habían desaparecido seguían sin tumores.

Información importante de seguridad (cont.)

Después de recibir JELMYTO (cont.):

- Para orinar, **tanto hombres como mujeres deben sentarse** en el inodoro y tirar la cadena varias veces después de usarlo. Después de ir al baño, lávese bien las manos, la cara interna de los muslos y la zona genital con agua y jabón.
- La ropa que entre en contacto con la orina debe lavarse de inmediato y por separado del resto de la ropa.

JELMYTO puede causar efectos secundarios graves como:

- **Inflamación y estrechamiento del conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga (obstrucción ureteral).** Si presenta inflamación y estrechamiento, para proteger el riñón de posibles daños, su proveedor de atención médica podría recomendarle colocar un pequeño tubo de plástico (stent) en el uréter para facilitar el drenaje del riñón. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta dolor en el costado del cuerpo o fiebre durante el tratamiento con JELMYTO.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Posibles efectos secundarios de JELMYTO

Comuníquese con el consultorio de su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios o si estos empeoran.

Los efectos secundarios graves pueden incluir:

- **Inflamación y estrechamiento del conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga (obstrucción ureteral):** su médico puede recomendar la colocación de un pequeño tubo plástico (stent) en el uréter para facilitar el drenaje del riñón. Esto le ayudará a orinar y protegerá el riñón. Informe a su médico de inmediato si presenta dolor en el costado del cuerpo o fiebre durante el tratamiento
- **Problemas en la médula ósea:** JELMYTO puede afectar la médula ósea y provocar una disminución del recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Su médico le hará análisis de sangre antes de cada tratamiento.

Estos fueron los efectos secundarios más frecuentes de JELMYTO en los ensayos clínicos:

- Infección urinaria
- Sangre en la orina
- Dolor en el costado del cuerpo
- Náuseas
- Problemas para orinar
- Problemas renales
- Vómitos
- Cansancio
- Dolor de estómago (abdomen)

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.



JELMYTO: un plan de tratamiento adecuado para usted

JELMYTO se administra como tratamiento ambulatorio, y normalmente podrá volver a casa el mismo día.



El tratamiento con JELMYTO se administra en una clínica, un hospital o un centro de cirugía ambulatoria y, por lo general, no es necesario pasar la noche allí.



JELMYTO ofrece dos opciones de instilación: un tubo de nefrostomía o un catéter ureteral.



JELMYTO se administra una vez por semana durante 6 semanas. Puede administrarse anestesia o un sedante, pero no es necesario.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Preguntas importantes para hacerle a su médico

Es importante que comprenda su tratamiento. No dude en utilizar estas preguntas cuando hable con su médico.

- ¿Cuáles son los objetivos de mi tratamiento?
- ¿Cómo me preparo para el tratamiento con JELMYTO?
- ¿Qué debo saber sobre mi programa de tratamiento?
- ¿Qué puedo esperar durante el tratamiento con JELMYTO?
- ¿Cómo sabré si mi tratamiento está funcionando?
- ¿Qué efectos secundarios podrían aparecer con el tratamiento?
¿Hay algo que a lo que deba prestar atención?
- ¿Mi tratamiento repercutirá en mi vida o en mi salud general?



Encuentre más información
y recursos en [JELMYTO.com](https://www.jelmyto.com)
o visítenos en Facebook en
[Facebook.com/JELMYTO](https://www.facebook.com/JELMYTO)

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Uso aprobado e información importante de seguridad

Uso aprobado de JELMYTO

JELMYTO® es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos con un tipo de cáncer que afecta el revestimiento de las vías urinarias superiores, incluido el riñón, llamado carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado (low-grade Upper Tract Urothelial Cancer, LG-UTUC).

Información importante de seguridad

No debe recibir JELMYTO si tiene un agujero o un desgarro (perforación) en la vejiga o el tracto urinario superior.

Antes de recibir JELMYTO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si:

- está embarazada o planea quedar embarazada. JELMYTO puede dañar al bebé en gestación. No debe quedar embarazada durante el tratamiento con JELMYTO. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con JELMYTO.

Mujeres que pueden quedar embarazadas: debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con JELMYTO y durante los 6 meses posteriores a la última dosis.

Hombres en tratamiento con JELMYTO: si tiene una pareja de sexo femenino que puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con JELMYTO y durante los 3 meses posteriores a la última dosis.

- está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si JELMYTO pasa a la leche materna. No dé el pecho durante el tratamiento con JELMYTO ni durante la semana posterior a la última dosis.
- **Informe a su proveedor de atención médica si toma diuréticos.**

¿Cómo recibirá JELMYTO?

- Su proveedor de atención médica le indicará que tome un medicamento llamado bicarbonato de sodio antes de cada tratamiento con JELMYTO.
- Su proveedor de atención médica le administrará la dosis de JELMYTO una vez por semana durante 6 semanas. Es importante que reciba las 6 dosis de JELMYTO de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica. Si falta a una cita, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible para reprogramarla. Es posible que su proveedor le recomiende hasta 11 dosis mensuales adicionales.
- JELMYTO se administra en el riñón a través de un tubo llamado "catéter".
- Durante el tratamiento con JELMYTO, es posible que su proveedor le indique que tome otros medicamentos o que modifique la forma en que toma sus medicamentos actuales.

Después de recibir JELMYTO:

- JELMYTO puede darle a la orina un color entre violeta y azul. Evite el contacto de la piel con la orina durante al menos 6 horas.
- Para orinar, **tanto hombres como mujeres deben sentarse** en el inodoro y tirar la cadena varias veces después de usarlo. Después de ir al baño, lávese bien las manos, la cara interna de los muslos y la zona genital con agua y jabón.
- La ropa que entre en contacto con la orina debe lavarse de inmediato y por separado del resto de la ropa.

JELMYTO puede causar efectos secundarios graves como:

- **Inflamación y estrechamiento del conducto que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga (obstrucción ureteral).** Si presenta inflamación y estrechamiento, para proteger el riñón de posibles daños, su proveedor de atención médica podría recomendarle colocar un pequeño tubo de plástico (stent) en el uréter para facilitar el drenaje del riñón. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta dolor en el costado del cuerpo o fiebre durante el tratamiento con JELMYTO.
- **Problemas en la médula ósea.** JELMYTO puede afectar la médula ósea y provocar una disminución de su recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes de cada tratamiento para controlar sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con JELMYTO. Es posible que su proveedor de atención médica tenga que suspender el tratamiento con JELMYTO, ya sea de forma temporal o permanente, si presenta problemas en la médula ósea durante el tratamiento con JELMYTO.

Los efectos secundarios más frecuentes de JELMYTO incluyen: infección urinaria, sangre en la orina, dolor en el costado del cuerpo, náuseas, problemas para orinar, problemas renales, vómitos, cansancio, dolor de estómago (abdomen).

Le recomendamos que notifique a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos con receta. Visite <http://www.fda.gov/medwatch> o llame al 1-800-FDA-1088. También puede notificar efectos secundarios a UroGen Pharma llamando al 1-855-987-6436.

Haga clic aquí para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.



Términos útiles que conviene conocer

- **Ambulatorio:** esto significa que puede recibir tratamiento médico sin pasar la noche en el hospital.
- **Anestesia:** pérdida de la sensibilidad o la conciencia provocada por medicamentos u otras sustancias. La anestesia evita que sienta dolor durante una cirugía u otros procedimientos.
- **Bajo grado:** se refiere a células cancerosas que son menos agresivas y tienen menos probabilidades de diseminarse hacia otras partes del órgano o del cuerpo.
- **Carcinoma urotelial del tracto superior:** cáncer que afecta el revestimiento de las vías urinarias superiores (el riñón y los uréteres).
- **Catéter:** tubo que se introduce en la vejiga para extraer orina del cuerpo. Un extremo del catéter se introduce por el pene o la vagina, se hace avanzar por la uretra y se introduce en la vejiga. El otro extremo está conectado a una bolsa que recoge la orina.
- **Nefroureterectomía radical (RNU):** el término médico que designa la cirugía que se realiza para extirpar un riñón, un uréter y una pequeña parte de la vejiga. Esta intervención también se conoce como “nefroureterectomía” o NU.
- **Pelvis renal:** zona situada en el centro de la parte interna del riñón.
- **Quimioterapia:** tipo de terapia que utiliza fármacos para detener el desarrollo de las células cancerosas. Actúa ya sea destruyendo las células o impidiendo que se dividan. La quimioterapia se puede administrar de diferentes maneras, según el tipo de cáncer que usted tenga.
- **Recurrencia:** cuando el cáncer que se extirpó o se curó, vuelve o reaparece.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.


Jelmyto[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

-
- **Tratamiento endoscópico/resección endoscópica:** intervenciones quirúrgicas menores que realiza un urólogo para extirpar tumores uroteliales del tracto superior. Estas operaciones también se pueden realizar con láser, pinzas u otros instrumentos quirúrgicos. Sin embargo, siempre se realizan utilizando un endoscopio o un ureteroscopio, lo que permite al urólogo ver el interior del cuerpo durante la intervención.
 - **Tubo de nefrostomía:** un catéter (tubo fino y flexible) que se introduce desde la espalda y atraviesa la piel hasta llegar a los riñones.
 - **Tumor:** bulto o masa anormal de tejido. Los tumores pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos).
 - **Uréteres:** tubos que transportan la orina hasta la vejiga.
 - **Urotelio:** un tipo especial de tejido que recubre el interior de las vías urinarias. Este revestimiento es el mismo en los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.



No es una paciente real.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.

**Jelmyto**[®]
(mitomycin) for pyelocalyceal solution

Un tipo de quimioterapia diferente que actúa directamente en el riñón para combatir el carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado



- Se ha demostrado que ayuda a eliminar los tumores en pacientes con LG-UTUC y a mantener a los pacientes sin tumores*
- Perfil de seguridad bien establecido
- Asistencia para el acceso y la cobertura del seguro disponible

*En un estudio realizado con 71 participantes, el 58 % de los pacientes adultos con carcinoma urotelial del tracto superior de bajo grado vieron desaparecer los tumores tras el tratamiento con JELMYTO. Al cabo de un año, el 56 % de estos pacientes seguían sin tumores.

No es un paciente real.

Escanee el código para escuchar a pacientes reales hablar sobre su experiencia con JELMYTO.



Información importante de seguridad (cont.)

JELMYTO puede causar efectos secundarios graves como (cont.):

- **Problemas en la médula ósea.** JELMYTO puede afectar la médula ósea y provocar una disminución de su recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes de cada tratamiento para controlar sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con JELMYTO. Es posible que su proveedor de atención médica tenga que suspender el tratamiento con JELMYTO, ya sea de forma temporal o permanente, si presenta problemas en la médula ósea durante el tratamiento con JELMYTO.

Los efectos secundarios más frecuentes de JELMYTO incluyen: infección urinaria, sangre en la orina, dolor en el costado del cuerpo, náuseas, problemas para orinar, problemas renales, vómitos, cansancio, dolor de estómago (abdomen).

Le recomendamos que notifique a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos con receta. Visite <http://www.fda.gov/medwatch> o llame al 1-800-FDA-1088. También puede notificar efectos secundarios a UroGen Pharma llamando al 1-855-987-6436.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y [haga clic aquí](#) para ver la Información de prescripción completa de JELMYTO, incluida la Información para el paciente.



JELMYTO® y UroGen® son marcas comerciales registradas de UroGen Pharma, Ltd. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2026 UroGen Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. US-JEL-01052 04/26

